

¿Qué necesito saber sobre la hidroxiclороquina?

(su pronunciación en inglés es “hye-drok-see-KLOR-uh-kwin”)

Otros nombres para este medicamento incluyen: Plaquenil®

Los medicamentos son una de las herramientas que su médico tiene para tratar su lupus. Tomar sus medicamentos como lo sugiere su médico mejorará su lupus. Y pueden prevenir problemas de salud más graves en el futuro. Si no toma sus medicamentos correctamente, puede poner en riesgo su salud y quizás su vida.

¿Por qué estoy tomando este medicamento?

Para controlar los signos y síntomas de su lupus para que se sienta mejor. Este medicamento funciona para mantener su lupus bajo control para ayudar a prevenir problemas futuros. Y este medicamento reducirá la cantidad de brotes que tenga.

¿Cómo tomo este medicamento?

- Su médico requiere que tome tabletas de 200 mg.
- Tome _____ tabletas por vía oral _____ veces al día.
- Tome este medicamento con comida. (Tome el medicamento justo antes, justo después o durante una comida. O puede tomar el medicamento con un refrigerio, como algunas galletas saladas).

¿Qué tan rápido funciona?

Debería comenzar a sentirse mejor en 1 o 2 meses. Sin embargo, pueden pasar de 6 a 12 meses antes de que se sienta lo mejor posible.

Me siento mejor, ¿puedo dejar de tomar el medicamento?

No, incluso si se siente mejor, debe seguir tomando su medicamento. No deje de tomarlo a menos que su médico le indique que puede hacerlo.

¿Hay algún efecto secundario?

Los efectos secundarios son síntomas (signos) o sensaciones no previstos que tiene cuando toma un medicamento. Algunos efectos secundarios ocurren justo cuando comienza a tomar un medicamento. Algunos ocurren solo de vez en cuando.

IMPORTANTE

Llame a su médico lo antes posible si tiene:

- Problemas para leer o ver (faltan palabras, letras o partes de objetos)
- Visión borrosa a distancia
- Ve destellos o rayos de luz
- Zumbidos en los oídos
- Debilidad muscular
- Sangrado o moretones en la piel
- Cambios en el estado de ánimo o mentales
- Latidos del corazón irregulares
- Problemas para controlar los movimientos del cuerpo
- Piel con ampollas o descamación

La mayoría de los efectos secundarios no son graves y desaparecen por sí solos. Otros pueden ser más molestos e incluso graves. Dé seguimiento a los efectos secundarios.

Informe a su médico de inmediato sobre cualquier signo o cambio inesperado en la forma en que se siente.

- Los efectos secundarios más comunes son náuseas, vómitos, calambres y diarrea (heces acuosas). Tomar este medicamento con alimentos a veces puede disminuir estas reacciones.
- Los efectos secundarios poco comunes incluyen cansancio, dolor de cabeza y falta de apetito. Generalmente desaparecen con el tiempo.
- Puede desarrollar anemia (no hay suficientes glóbulos rojos para transportar oxígeno por el cuerpo).
- Este medicamento puede causar serios problemas con su vista. Necesitará realizarse exámenes oculares con regularidad para detectar problemas.

¿Qué cosas necesito saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Informe a su médico sobre todos los medicamentos que usa. Esto incluye recetas, medicamentos que compra en la tienda, vitaminas y productos herbales. No comience a tomar un nuevo medicamento sin primero informarlo a su médico.
- Puede quemarse con el sol más fácilmente. Evite el sol, las lámparas solares y las camas de bronceado. Use protector solar y use ropa y anteojos que lo protejan del sol.
- Hable con sus médicos si está embarazada o si está pensando en quedar embarazada.
- Informe a su médico si está amamantando. Deberán hablar sobre los riesgos para su bebé.



Mantenga este y todos los otros medicamentos fuera del alcance de los niños. Nunca comparta sus medicamentos con otras personas. Use este medicamento solo por el motivo que indicó el médico.

¿Qué seguimiento necesito?

Necesitará exámenes oculares con regularidad.

¿Cuál es el número de teléfono del médico? (585) 486-0901