

¿Qué necesito saber sobre la azatioprina?

(su pronunciación en inglés es “ay-za-THYE-oh-preen”)

Otros nombres para este medicamento incluyen: Imuran®, Azasan®

Los medicamentos son una de las herramientas que su médico tiene para tratar su lupus. Tomar sus medicamentos como lo sugiere su médico mejorará su lupus. Y pueden prevenir problemas de salud más graves en el futuro. Si no toma sus medicamentos correctamente, puede poner en riesgo su salud y quizás su vida.

¿Por qué estoy tomando este medicamento?

La azatioprina se usa para ayudar a evitar que su sistema inmunitario ataque sus articulaciones y otras partes del cuerpo. Ayuda a controlar su lupus para que se sienta mejor.

¿Cómo tomo este medicamento?

- Su médico requiere que tome tabletas de azatioprina de _____ mg.
- Tome _____ tabletas por vía oral _____ veces al día.

¿Qué tan rápido funciona?

Este medicamento puede tomar de 6 a 12 semanas antes de que comience a sentirse mejor. Es posible que su médico necesite ajustar la cantidad de medicamento que toma.

Me siento mejor, ¿puedo dejar de tomar el medicamento?

No, incluso si se siente mejor, debe seguir tomando su medicamento. No deje de tomarlo a menos que su médico le indique que puede hacerlo.

¿Hay algún efecto secundario?

Los efectos secundarios son síntomas (signos) o sensaciones no previstos que tiene cuando toma un medicamento. Algunos efectos secundarios ocurren justo cuando comienza a tomar un medicamento. Algunos ocurren solo de vez en cuando.

URGENTE

Llame a su médico de inmediato, de día o de noche, si tiene:

- **Fiebre**
- **Sarpullido**

IMPORTANTE

Llame a su médico lo antes posible si tiene:

- Vómitos
- Sudoración nocturna
- Comezón
- Pérdida de apetito
- Pérdida de peso
- Cansancio
- Dolor en la parte superior del estómago
- Formación de moretones o sangrado con facilidad
- Sensación de mareo o dificultad para respirar
- Frecuencia cardíaca rápida
- Coloración amarillenta en la piel o los ojos

La mayoría de los efectos secundarios no son graves y desaparecen por sí solos. Otros pueden ser más molestos e incluso graves. Dé seguimiento a los efectos secundarios. **Informe a su médico de inmediato sobre cualquier signo o cambio inesperado en la forma en que se siente.**

- Los efectos secundarios más comunes son náuseas, vómitos y diarrea (heces acuosas). Tomar este medicamento con alimentos a veces puede disminuir estas reacciones.
- Se puede presentar una reacción alérgica con síntomas similares a la gripe y sarpullido. Esto es poco común.
- Este medicamento puede disminuir la cantidad de células que combaten las infecciones en su sangre. Evite estar cerca de personas enfermas o que tengan infecciones. Su médico revisará sus análisis de sangre regularmente.

¿Qué cosas necesito saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Informe a su médico sobre todos los medicamentos que usa. Esto incluye recetas, medicamentos que compra en la tienda, vitaminas y productos herbales. No comience a tomar un nuevo medicamento sin primero informarlo a su médico.
- Es importante saber que muchos medicamentos no deben mezclarse con alcohol.
- Hable con su médico antes de recibir cualquier inyección. Algunas inyecciones no son buenas para usted mientras toma este medicamento.
- Informe a su médico si está amamantando.



Mantenga este y todos los otros medicamentos fuera del alcance de los niños. Nunca comparta sus medicamentos con otras personas. Use este medicamento solo por el motivo que indicó el médico.

¿Qué seguimiento necesito?

Se le realizarán análisis de sangre con regularidad. Es importante que se le realicen análisis de sangre. Esta es la manera en que su médico verifica los efectos secundarios del medicamento.

¿Cuál es el número de teléfono del médico? (585) 486-0901