



DIVISIÓN DE CIRUGÍA COLORRECTAL

Larissa Temple, MD
Jenny R. Speranza, MD
Christina Cellini, MD
Fergal J. Fleming, MD

Rabih Salloum, MD
Gabriela Poles, MD
Lisa Cannon, MD
Dennis Blom, MD

Office: 585-273-2727
FAX: 585-276-2203

Nombre: _____ Fecha y hora: _____ Médico: _____

AVISO IMPORTANTE - Lea estas instrucciones por lo menos 2 semanas antes de la colonoscopía. No cumplir con estas instrucciones puede resultar en la cancelación del procedimiento. Si tiene preguntas o dudas, llame al: 585-273-2727 (lunes a viernes, 8:30 am - 4:00 pm).

Información clave:

- * Si tiene **un marcapasos, un marcapasos/desfibrilador, estreñimiento crónico o si recibe tratamientos de diálisis**, debe llamar la oficina para instrucciones adicionales al 585-273-2727.
- * Debe seguir las instrucciones de preparación **AL PIE DE LA LETRA**. Así el médico podrá realizarle la colonoscopía correctamente.
- * Debe ser acompañado por una persona mayor de edad quien lo llevará a la casa después de la colonoscopía. Si piensa regresar a casa en autobús o en taxi, tiene que ser acompañado por una persona mayor de edad. No puede manejar un vehículo o trabajar hasta el día siguiente.
- * Debe comprar los siguientes medicamentos de preparación:
-Una botella de Miralax de 238 gramos (Nombre genérico: Polietilenglicol)
-Dulcolax LAXANTE tabletas (Nombre genérico: Bisacodilo) necesita 4 tabletas.
-Dos botellas de Gatorade o de G2 (bebida alternativa baja en azúcar) de 32 onzas (menos el rojo o el morado).

Medicamentos

- * **Anticoagulantes**- como Coumadin® (warfarina), Plavix® (clopidogrel), Ticlid® (cloridrato de ticlopidina), Agrylin® (anagrelida), o Aspirina debe **suspender**  estos medicamentos 5 días antes de la colonoscopía. **ES PRECISO** que se comunique con el médico que le receta estos medicamentos para verificar que sea posible suspenderlos.
- * **No tome ningún medicamento antiinflamatorio no esteroide (AINE)** 5 días antes del procedimiento: Ibuprofeno, Motrin, Celebrex, Aspirina, o Ketorolaco.

- * **Pacientes diabéticos:**
Pastillas: Tome la mitad (½) de la dosis el día antes del procedimiento, y no tome sus pastillas el día del procedimiento.
Insulina: Suspenda su insulina normal y tome la mitad (½) de la dosis normal de la insulina de acción prolongada el día antes del procedimiento y el día del procedimiento.
Bombas de insulina: La dosis depende de las recomendaciones del médico que le receta este medicamento.
¡Compruebe el nivel de glucosa con mucha frecuencia!

Preparación para la colonoscopía

Un día antes de la colonoscopía:

- * ¡No coma comidas sólidas!
- * Tiene que seguir una dieta líquida absoluta (de líquidos claros) por TODO EL DÍA ANTES de la colonoscopía
- * Prepare la mezcla de bebida (*Miralax/Gatorade*). Mezcle la mitad ($\frac{1}{2}$) de los contenidos del Miralax en cada botella de Gatorade y agítelas hasta que la mezcla se disuelva totalmente. (Puede refrigerarlas si lo desea)

PUEDE COMER Y TOMAR:

- Refrescos claros (Ginger Ale, Sprite, 7-up)
- Gatorade/PowerAde® (**MENOS EL ROJO y EL MORADO**)
- Caldo de pollo/de res (sin otros contenidos)
- Jell-O® (**MENOS EL ROJO y EL MORADO**)
- Popsicles (**MENOS LOS ROJOS y LOS MORADOS**)
- Limonada (**SIN pulpa**)
- Kool-Aid (**MENOS EL ROJO y EL MORADO**)
- Agua con vitaminas (**MENOS EL ROJO y EL MORADO**)
- Jugos claros (manzana, arándano blanco, uva blanca)
- Café o té negro (puede tomarlo con azúcar, pero **NO con leche o crema**)

Si el procedimiento está programado por la MAÑANA (8:30 - 11:45 am)

1. A las 4:00 pm el día antes del procedimiento, tome las cuatro tabletas de Dulcolax con agua y siga tomando líquidos claros.
2. A las 6:00 pm el día antes del procedimiento, puede empezar a tomar la mezcla de Miralax y Gatorade.
3. Tome 8 onzas cada 15 minutos hasta que se acabe la mezcla (las 2 botellas enteras).
4. Puede seguir tomando líquidos claros hasta 4 horas antes del procedimiento.
5. No tome ningún líquido, ni agua, por 4 horas antes del procedimiento.

NO PUEDE COMER NI TOMAR:

- Refrescos rojos, verdes y oscuros
- Jugo de uva, toronja y china
- Sopas cremosas
- Alcohol
- Fudgesicles
- Jugos de frutas con pulpa
- Yogur y pudín
- Leche y productos de leche
- Comidas sólidas

Si el procedimiento está programado por la TARDE (12:00 - 4:30 pm)

1. A las 4:00 pm el día antes del procedimiento, tome las cuatro tabletas de Dulcolax con agua y siga tomando líquidos claros.
2. A las 6:00 pm el día antes del procedimiento, puede empezar a tomar **una botella** de la mezcla de Miralax y Gatorade.
3. Tome 8 onzas cada 15 minutos hasta que se acabe la primera botella de la mezcla.
4. A las 7 am el día del procedimiento, tome la otra botella de la mezcla de Miralax y Gatorade - 8 onzas cada 15 minutos hasta que se acabe.
5. No tome ningún líquido, ni agua, por 4 horas antes del procedimiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE

- ★ Un enfermero llamará a usted 2 semanas antes del procedimiento para revisar su historial médico y sus medicamentos recetados.
- ★ Use toallitas húmedas desechables para reducir el dolor que pueda tener a causa de las evacuaciones frecuentes.
- ★ Deje todas sus pertenencias de valor y joyería en casa.
- ★ Debe traer una tarjeta de identificación con foto y la tarjeta del seguro médico.
- ★ Tiene que quedarse por 3 horas en el Centro de Cirugías para el procedimiento.


AVISO IMPORTANTE:

- ★ No cumplir con estas instrucciones puede resultar en la cancelación del procedimiento.
- ★ Recuérdese que mientras la colonoscopía por lo general es un procedimiento seguro, aún existe el leve riesgo de resultar complicaciones que no se descubren hasta una semana después o más.

- ★ Se le recomienda que no viaje por dos semanas después de la colonoscopía.
- ★ Se le enviará una copia del resumen del procedimiento a su médico primario y/o al médico que le refirió para el estudio.

Dirección del procedimiento:

Centro de Cirugías de la URMC
 180 Sawgrass Drive
 Suite 100 (Primer piso)
 Rochester, NY 14620
 585-242-1401



Cómo llegar desde el norte

Tome la interestatal 390 al sur hasta (la salida 16B) la ruta NY-15A/East Henrietta Road, y doble a la **izquierda** en la East Henrietta Road. Doble a la **derecha** en la Westfall Road. Doble a la **derecha** al semáforo en la Sawgrass Drive y siga la rotonda - nuestra clínica está a la **izquierda**.

Cómo llegar desde el sur

Tome la interestatal 390 al norte hasta (la salida 16) la ruta NY-15A/East Henrietta Road, y doble a la **derecha** en la East Henrietta Road. Doble a la **derecha** en la Westfall Road. Doble a la **derecha** al semáforo en la Sawgrass Drive y siga la rotonda - nuestra clínica está a la **izquierda**.

Cómo llegar desde el este

Tome la interestatal 90 al oeste hasta (la salida 46) la interestatal 390 al norte; siga la 390 al norte hasta (la salida 16) la ruta NY-15A/East Henrietta Road. Doble a la **derecha** en la East Henrietta Road. Doble a la **derecha** en la Westfall Road. Doble a la **derecha** al semáforo en la Sawgrass Drive y siga la rotonda - nuestra clínica está a la **izquierda**.

Cómo llegar desde el oeste

Tome la interestatal 90 al este hasta (la salida 46) la interestatal 390 al norte; hasta (la salida 16) la ruta NY-15A/East Henrietta Road. Doble a la **Izquierda** en la East Henrietta Road. Doble a la **derecha** en la Westfall Road. Doble a la **derecha** al semáforo en la Sawgrass Drive y siga la rotonda - nuestra clínica está a la **izquierda**.